

# ІНСТРУКЦІЯ

## для медичного застосування лікарського засобу

### КСЕРОФОРМ (XEROFORM)

#### **Склад:**

*діюча речовина:* bismuth tribromophenate;

1 флакон полімерний з насадкою містить вісмуту трибромфеноляту (ксероформу) 10 г.

**Лікарська форма.** Порошок нашкірний.

*Основні фізико-хімічні властивості:* аморфний порошок жовтого кольору зі слабким специфічним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

#### **Фармакологічні властивості.**

Вісмуту трибромфенолят (ксероформ) має антисептичні, в'язучі та підсушуючі властивості. Дія препарату полягає у взаємодії з білками тканин із утворенням альбумінатів, які подібно захисній плівці оберігають чутливі нервові закінчення від подразнення, а також у звуженні судин, зменшенні їх проникності (зменшується ексудація) та інгібуванні ферментів; взаємодія з білками мікроорганізмів пригнічує їхню життєдіяльність.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Як в'язучий, підсушуючий та антисептичний засіб при запальних захворюваннях шкіри.

##### **Противоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість.

##### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не встановлена.

##### **Особливості застосування.**

Не допускати потрапляння препарату в очі.

##### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Немає даних щодо застосування препарату у період вагітності або годування груддю, тому препарат слід призначати тільки тоді, коли, на думку лікаря, очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

##### **Спосіб застосування та дози.**

Застосовують зовнішньо. Порошок наносять на уражені ділянки шкіри. Термін лікування залежить від перебігу захворювання та встановлюється лікарем індивідуально.

##### **Діти.**

Ефективність і безпека при застосуванні препарату дітям не встановлені. З цієї причини його застосування можливе тільки під наглядом та за призначенням лікаря.

***Передозування.***

Дані відсутні.

***Побічні реакції.***

Не відзначалися.

У разі появи будь-яких небажаних реакцій лікування слід припинити та проконсультуватися з лікарем.

***Термін придатності.***

5 років.

***Умови зберігання.***

Зберігати при температурі не вище +30 °С в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 10 г порошку у флаконі полімерному з насадкою, по 1 флакону полімерному у коробці з картону.

***Категорія відпуску.***

Без рецепта.

***Виробник.***

ТОВ «Исток-Плюс».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.** Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.